


ラクツロース・シロップ **60%**
分包10mL・15mL「コーワ」を服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。




2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。服用後の残液は廃棄し、保存しないでください。


Kowa 興和株式会社

20.7作成KB

ラクツロース・シロップ **60%**
分包10mL・15mL「コーワ」を服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。




2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。服用後の残液は廃棄し、保存しないでください。

Kowa 興和株式会社

20.7作成KB

ラクツロース・シロップ **60%**
分包10mL・15mL「コーワ」を服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。




2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。服用後の残液は廃棄し、保存しないでください。


Kowa 興和株式会社

20.7作成KB

ラクツロース・シロップ **60%**
分包10mL・15mL「コーワ」を服用される方へ



1. このお薬は液状です。開封時はスティックを図のようにタテに持ち、切り口から開け、完全に切り取ってください。その際、中のお薬が飛び出さないよう注意してください。服用直前まで開封しないでください。



2. お薬を飲む時は、切り口に口をつけて、お飲みください。飲む際に切り口で、ケガをしないように注意してください。飲みにくい場合は、コップに移してお飲みください。服用後の残液は廃棄し、保存しないでください。

Kowa 興和株式会社

20.7作成KB