



パルモディア[®]錠0.1mgを
服用される患者さんへ

パルモディア[®]錠0.1mgを 服用される患者さんへ

このお薬は、血液中の中性脂肪(トリグリセライド: TG)を低下させ、
HDL-コレステロールを増加させる効果があります。



(実物大)

パルモディア錠の飲み方



朝

通常、1回0.1mg(1錠)

1日2回(朝、夕)



夕

*: 1回0.2mg (2錠) を1日2回まで増量することがあります。

- ・ 肝臓に障害がある人や過去に肝臓に障害があった人は、飲む量を減らす場合があります。
- ・ 腎臓に軽度の障害がある人は、低用量から飲み始めたり、飲む回数を減らす場合があります。

飲み忘れたときは

- ・ 決して2回分を一度に飲まないでください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついたときに、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の時間に1回分を飲んでください。

パルモディア[®]錠0.1mgを 服用するにあたっての注意点

次のような自覚症状があらわれた場合は副作用の可能性があります。特にいくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、重大な副作用の可能性があるため、ただちに主治医又は薬剤師にご相談ください。



全身の脱力感、
手足のこばり、手足のしびれ



筋肉の痛み



尿が赤褐色になる

このほか何か気になる症状がありましたら、主治医又は薬剤師にご相談ください。

