

アリドネ[®]パッチの使い方

このお薬は、皮膚から吸収された有効成分によって、記憶障害などの症状の進行を遅らせる働きがあります。
医師や薬剤師の指示に従ってご使用ください。


【貼る時間について】

- 1日1回1枚お薬を貼ります。
- 同じくらいの時間にお薬を貼りかえます。

【貼る場所について】

- 背中、上腕、胸のいずれか1カ所に貼ります。
- 貼る場所は毎回変えます。
- 一度貼った場所には7日間以上の間隔をあけてから貼ります。

7日間以上の間隔をあけて貼るための例



8日目まで終わったら、再び1日目に戻ります。
の箇所に1枚貼ります。

【貼る場所の注意】

- 直射日光があたらないよう、衣服などで隠れる場所を選んでください。
- 清潔で乾燥した場所、体毛が少ない場所、衣服を着用してもこすれにくい場所に貼ってください。
- 傷や湿疹・皮膚炎などがある場所には貼らないでください。
- クリーム、ローション、パウダー、軟膏などをぬったばかりの場所には貼らないでください。

【お薬の貼りかえ方】

1 前日のお薬をはがす




新しいお薬を貼る前に、必ず前日のお薬をはがしてください。
(一度に2枚以上貼らないでください)

2 貼る場所を乾いたタオルなどでふき、清潔にする



水分や汗をよく取り除いてください。

3 包装袋からお薬を取り出す



内部のパッチを傷つけないように、包装袋の2カ所を番号順(①→②)に手で切り取り、中のパッチを取り出してください。

4 日時を記入する




パッチ表面に、貼る日付と時間をペン・ボールペンなどで記入してください。

5 透明フィルムを半分はがす



パッチには透明フィルムがついています。粘着面に触れないように、半分はがしてください。
(お薬は、ハサミなどで切って使用しないでください)

6 お薬を貼る



粘着面を背中、上腕、胸のいずれかにあて、残りの透明フィルムをはがしながら貼ってください。

7 お薬を押さえる



パッチがしっかりとくっつくまで、手のひらで押さえてください。

8 手を洗う




パッチを貼り終わったら、手を流水で洗ってください。
手を洗う前に、目や口に触れないようにしてください。

【貼っている間の注意】

- お薬を貼っている間とはがした後の3週間は、貼った場所を衣服でおおうなどして、直射日光があたらないようにしてください。
- お薬を貼った場所が、あなか、こたつ、電気毛布、カイロ、湯たんぽ、サウナなどで熱くならないようにしてください。
- 車の運転や危険を伴う機械の操作はしないでください。

【貼り忘れたとき、はがれたときの注意】

- 貼り忘れに気づいたときは、気づいた時点で新しいお薬を貼ってください。
次からはいつもと同じ時間に貼りかえてください。
貼り忘れに気づいても2枚以上を一度に貼ってはいけません。
- はがれそうなときは、再度手で押さえて貼ってください。
完全にはがれたときは、新しいお薬に貼りかえ、
はがれたお薬は捨ててください。
次からはいつもと同じ時間に貼りかえてください。




【副作用について】

- 主な副作用として、皮膚症状（お薬を貼った場所がかゆくなる、赤くなるなど）や消化器症状（下痢、食欲不振、吐き気、嘔吐など）が報告されています。
- お薬を使用して気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

【お薬の捨て方】

- お薬をはがすときは、皮膚を傷つけないよう、ゆっくりとやさしくはがしてください。
使用済みのお薬には成分が残っているため、粘着面を内側にして折りたたみ、子どもの目や手の届かないところに捨ててください。



【保管上の注意】

- 子どもの目や手の届かないところで、高温を避けて保管してください。
- お薬は折り曲げないでください。
（折り曲げることにより、包装袋の中で透明フィルムがはがれてしまう可能性があります）
- 包装袋は貼る直前まで開けないでください。
- 処方された患者さん以外は使用しないでください。

このお薬について分からないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。



製造販売元

帝國製薬株式会社



販売元

興和株式会社