

パルモディア[®] XR錠^{0.2mg}_{0.4mg} を
服用される患者さんへ

PDFはこちら



Kowa 興和株式会社

1日1回の パルモディアXR錠[®]0.2mg 錠0.4mgを 服用される患者さんへ

このお薬は、血液中の中性脂肪(トリグリセライド: TG)を低下させ、
HDL-コレステロールを増加させる効果があります。

パルモディアXR錠0.2mg



パルモディアXR錠0.4mg



(実物大)

パルモディアXR錠の飲み方

1回0.2mg(最大0.4mg)、1日1回

*: 飲む量は、あなたの症状などに合わせて医師が決めます。

お薬をくだいたり、すりつぶしたりして飲むことはできません。
かまずにそのまま飲んでください。

飲み忘れたときは

- 決して2回分を一度に飲まないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときに、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の時間に1回分を飲んでください。

パルモディア[®] XR錠 0.2mg / 0.4mg を服用するにあたっての注意点

次のような自覚症状があらわれた場合は副作用の可能性あります。特にいくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、重大な副作用の可能性があるので、ただちに主治医又は薬剤師にご相談ください。



全身の脱力感、
手足のこわばり、手足のしびれ



筋肉の痛み



尿が赤褐色になる

このほか何か気になる症状がありましたら、主治医又は薬剤師にご相談ください。

