

ラクツロース末・P

販売中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、永年に亘りご愛顧賜りました「ラクツロース末・P」につきまして、誠に勝手ながら諸般の事情により弊社在庫がなくなり次第販売を中止させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

ご迷惑をおかけすることになり誠に恐縮に存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

本製品は2015年4月に経過措置品目へ移行し、2016年3月末日をもちまして経過措置期間満了となる予定です。

なお、「ラクツロース・シロップ60%「コーワ」」につきましては販売を継続致しますので、今後とも引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 販売中止品目／弊社在庫終了予定時期

販売名	包装	JANコード	薬価基準収載 医薬品コード	弊社在庫終了予定時期
ラクツロース末・P	6g×126包	4987770544100	3999001B2039	2015年5月中旬頃
	9g×126包	4987770544209		2015年5月中旬頃
	300g	4987770544001		2015年5月中旬頃

*統一商品コードは、JANコードから上4桁(4987)を除いた9桁のコードです。

※在庫終了予定時期は販売状況により前後する場合がございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

■ 経過措置期間満了予定日

2016年3月末日

以上

「ラクツロース末・P」と「ラクツロース・シロップ60%「コーワ」」の比較

販売名	ラクツロース末・P	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
成分・含量	1g中結晶ラクツロース原薬1g	100mL中ラクツロース60g
添加物	含有しない	パラベン、カラメル
剤形	散剤	シロップ剤
効能・効果	高アンモニア血症に伴う下記症候の改善 精神神経障害、脳波異常、手指振戦	
用法・用量	通常成人1日量18～36gを2～3回に分けて用時、水又は湯水に溶解後経口投与する。 なお、本剤の投与により、下痢が惹起されることがあるので少量より投与を開始して漸増し、1日2～3回の軟便が見られる量を投与する。	通常成人1日量30～60mLを2～3回に分けて経口投与する。症状により適宜増減する。 なお、本剤の投与により、下痢が惹起されることがあるので少量より投与を開始して漸増し、1日2～3回の軟便が見られる量を投与する。
薬価	1g 8.60円	60%1mL 5.80円
包装	6g×126包、9g×126包、300g	10mL×126包、15mL×126包、500mL瓶、500mL×6瓶

興和創薬株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

2014.9作成