

アデホス-L_{コウ}注 10mg・20mg

用法並びにアンプルラベル変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、「アデホス-L_{コウ}注10mg・20mg」につきまして、用法並びに包装変更がございますのでご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

1. 対象製品・包装

アデホス-L_{コウ}注10mg : 50アンプル

アデホス-L_{コウ}注20mg : 50アンプル

2. 変更内容

■用法・用量

用法変更が承認されました。

改訂前(下線部削除)	改訂後
用法・用量 1. 静注の場合 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物として、通常1回5～40mgを1日1～2回、等張ないし高張ブドウ糖注射液に溶解して、徐々に静脈内注射する。 2. 点滴静注の場合(注40mgのみ) アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物として、通常1回40～80mgを1日1回、5%ブドウ糖注射液200～500mLに溶解し、30～60分かけて点滴静脈内注射する。	用法・用量 1. 静注の場合 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物として、通常1回5～40mgを1日1～2回、等張ないし高張ブドウ糖注射液に溶解して、徐々に静脈内注射する。 2. 点滴静注の場合 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物として、通常1回40～80mgを1日1回、5%ブドウ糖注射液200～500mLに溶解し、30～60分かけて点滴静脈内注射する。

※改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数がかかりますので、今後のご使用に際しましては、上記改訂内容をご参照ください。

また、改訂添付文書は弊社ホームページ(<http://www.kowa-souyaku.co.jp/>)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)に掲載いたしますので、併せてご利用ください。

■アンプルラベル

施用部位等表示に「点滴」を追加します。

従来品	変更品
左 : アデホス-L _{コウ} 注 10mg 右 : アデホス-L _{コウ} 注 20mg	左 : アデホス-L _{コウ} 注 10mg 右 : アデホス-L _{コウ} 注 20mg

3. 従来品・変更品の識別方法

本変更に伴う個装箱と梱包箱へのお知らせ表示は行いませんのでご了承ください。

4. 変更品の出荷案内

販売名	包装	統一商品コード	従来品		変更品		
			最終製造番号	使用期限	初回製造番号	使用期限	出荷予定時期
アデホス-L _{コウ} 注10mg	50アンプル	770501806	CY5E	2018年6月	DA6A	2019年3月	2016年6月中旬頃
アデホス-L _{コウ} 注20mg	50アンプル	770501905	GG5M	2018年7月	GH6A	2019年3月	2016年6月中旬頃

※流通在庫状況により、上記出荷予定時期と前後する場合がございますのでご了承ください。



興和創薬株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

2015.11作成