

2016年3月末日経過措置期間満了のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2014年9月に販売中止のご案内をいたしました「ラクツロース末・P」につきまして、2016年3月末日をもちまして経過措置期間満了となりますのでご案内申し上げます。

2016年4月1日以降は保険請求の対象外となりますので、何卒ご留意賜りますようお願い申し上げます。

なお、「ラクツロース・シロップ60%「コーワ」」につきましては販売を継続致しますので、今後とも引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■販売中止品目

販売名	包装	統一商品コード	薬価基準収載 医薬品コード
ラクツロース末・P	6g×126包	770544100	3999001B2039
	9g×126包	770544209	
	300g	770544001	

■経過措置期間満了日

2016年3月末日

以上

「ラクツロース末・P」と「ラクツロース・シロップ60%「コーワ」」の比較

販売名	ラクツロース末・P	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
成分・含量	1g中結晶ラクツロース原薬1g	100mL中ラクツロース60g
添加物	含有しない	パラベン、カラメル
剤形	散剤	シロップ剤
効能・効果	高アンモニア血症に伴う下記症候の改善 精神神経障害、脳波異常、手指振戦	
用法・用量	通常成人1日量18～36gを2～3回に分けて用時、水又は湯水に溶解後経口投与する。 なお、本剤の投与により、下痢が惹起されることがあるので少量より投与を開始して漸増し、1日2～3回の軟便が見られる量を投与する。	通常成人1日量30～60mLを2～3回に分けて経口投与する。症状により適宜増減する。 なお、本剤の投与により、下痢が惹起されることがあるので少量より投与を開始して漸増し、1日2～3回の軟便が見られる量を投与する。
薬価	1g 8.60円	60%1mL 5.80円
包装	6g×126包、9g×126包、300g	10mL×126包、15mL×126包、500mL瓶、500mL×6瓶