

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年6月

製造販売元 興和株式会社
販売提携 興和創薬株式会社

アレルギー性疾患治療剤
日本薬局方 クロルフェニラミンマレイン酸塩散
ネオレスタミンコーワ散1%
NEORESTAMIN^{kowa} POWDER 1%
アレルギー性疾患治療剤
レスタミンコーワ錠10mg
RESTAMIN^{kowa} TABLET 10mg
(ジフェンヒドラミン塩酸塩錠)

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。
なお、新しい添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 改訂内容〔下線部：追記・変更〕

●ネオレスタミンコーワ散1%

改訂後 (2019年6月改訂)	改訂前
禁忌(次の患者には投与しないこと) (1) <u>閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕</u> (2)～(4)省略 (現行のとおり)	禁忌(次の患者には投与しないこと) (1) 緑内障のある患者〔抗コリン作用により房水流出路が狭くなり眼圧が上昇し、緑内障を増悪させるおそれがある。〕 (2)～(4)省略
1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) (1) <u>開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕</u> (2)～(6)省略 (現行のとおり)	1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) (1)～(5)省略

●レスタミンコーワ錠10mg

改訂後 (2019年6月改訂)	改訂前
禁忌(次の患者には投与しないこと) (1) <u>閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕</u> (2)省略 (現行のとおり)	禁忌(次の患者には投与しないこと) (1) 緑内障の患者〔抗コリン作用により房水流出路が狭くなり眼圧が上昇し、緑内障を悪化させるおそれがある。〕 (2)省略
1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) <u>開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕</u>	記載なし

2. 改訂理由

令和元年6月18日付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生安通知）に基づき、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No. 281（2019年7月発行）に掲載される予定です。改訂後の添付文書は弊社ホームページ <https://medical.kowa.co.jp/product/> 及び医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に最新添付文書が掲載されます。

製品情報お問い合わせ先：興和株式会社 くすり相談センター

電話：0120-508-514 03-3279-7587 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）