

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年6月

製造販売元 興和株式会社

Rhoキナーゼ阻害薬-緑内障・高眼圧症治療剤-
リパスジル塩酸塩水和物点眼液
処方箋医薬品^{注)}

グラナテック[®]点眼液0.4%

GLANATEC[®] ophthalmic solution 0.4%

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 改訂内容〔取り消し線部：削除箇所、下線部：追記・変更箇所〕

改訂後 (2023年6月改訂)	改訂前
<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤交付時の注意</p> <p>患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。</p> <ul style="list-style-type: none">薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。患眼を開瞼して結膜嚢内に点眼し、1~5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。本剤に含まれているベンザルコニウム塩化物はソフトコンタクトレンズに吸着されることがあるので、ソフトコンタクトレンズを装着している場合には、<u>点眼前にレンズを外し、点眼後少なくとも5分以上間隔をあけてから再装着すること。</u>	<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤交付時の注意</p> <p>患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。</p> <ul style="list-style-type: none">薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、患眼を開瞼して結膜嚢内に点眼し、1~5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。本剤に含まれているベンザルコニウム塩化物はソフトコンタクトレンズに吸着されることがあるので、ソフトコンタクトレンズ装着時の点眼は避けること。

2. 改訂理由

一般的に周知されている点眼方法として仰臥位をとることは規定されていないため、「点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、」を削除しました。また、グラアルファ配合点眼液（リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩）の適用上の注意に合わせ、点眼してからソフトコンタクトレンズを再装着するまでの時間に関する注意を追記しました。

- 今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No. 318（2023年7月発行）に掲載される予定です。
- 本剤の最新の電子添文は、下記に掲載されておりますのでご参照くださいますようお願い申し上げます。
 - 弊社ホームページ <https://medical.kowa.co.jp/product/>
 - PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」 <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>
 - 「添文ナビ」をご利用の際はこちらのバーコードをお読み取りください。



製品情報お問い合わせ先：興和株式会社 くすり相談センター

電話：0120-508-514 03-3279-7587 受付時間：9:00~17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）