

新発売のご案内

LIVALO TAB. 4mg

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、

HMG-CoA還元酵素阻害剤
リバロ錠 4mg
(ピタバスタチンカルシウム製剤)

を新発売させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。
何卒ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白



発売日

2012年6月22日(金)

薬価基準収載日

2012年6月22日(金)

組成・性状

販売名	リバロ錠4mg
成分・含量	1錠中 ピタバスタチンカルシウム4.0mg
添加物	乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、クエン酸トリエチル、二酸化ケイ素、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色五号、三酸化鉄
色調・剤形	淡黄色・割線入りフィルムコーティング錠
外形	 直径8.6mm 厚さ3.9mm 重量249mg
識別コード	

効能・効果

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

〔効能・効果に関連する使用上の注意〕

- (1)適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
- (2)家族性高コレステロール血症のうちホモ接合体については使用経験がないので、治療上やむを得ないと判断される場合のみ、LDL-アフェレーシス等の非薬物療法の補助として本剤の適用を考慮すること。

用法・用量

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回夕食後に経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

〔用法・用量に関連する使用上の注意〕

- (1)肝障害のある患者に投与する場合には、開始投与量を1日1mgとし、最大投与量は1日2mgまでとする。
- (2)本剤は投与量(全身曝露量)の増加に伴い、横紋筋融解症関連有害事象が発現するので、4mgに増量する場合には、CK(CPK)上昇、ミオグロビン尿、筋肉痛及び脱力感等の横紋筋融解症前駆症状に注意すること。〔海外臨床試験において8mg以上の投与は横紋筋融解症及び関連有害事象の発現により中止されている。〕

規制区分

処方せん医薬品

貯法

遮光、室温保存

使用期限

3年



興和創薬株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

■ 価格

販売名	包装	規格単位	薬価	包装単位薬価
リバロ錠4mg	PTP100錠	4mg 1錠	238.70円	23,870.00円

■ 各種コード

販売名	包装	承認番号	薬価基準収載 医薬品コード	レセプト電算処理 システムコード	JANコード*	調剤包装単位コード 販売包装単位コード	HOT番号
リバロ錠4mg	PTP100錠	22400AMX00047000	2189016F3020	622136401	 4 987770 526304	 (01)04987770526311  (01)14987770526301	1213645020101

*統一商品コードは、JANコードから上4桁(4987)を除いた9桁のコードです。

■ 個装箱・梱包箱のサイズ

販売名	包装 [梱包単位]	個装箱		梱包箱	
		サイズ(長辺×短辺×高さ)	重量	サイズ(長辺×短辺×高さ)	重量
リバロ錠4mg	PTP100錠 [100]	147mm×53mm×37mm	64g	565mm×320mm×220mm	6,950g



LIVALO TAB. 4mg