

# 用法一部変更のご案内

2013年3月



HMG-CoA還元酵素阻害剤  
**リバロ錠** 1mg  
2mg  
4mg  
(ピタバスタチンカルシウム錠)



興和株式会社  
興和創薬株式会社

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、HMG-CoA還元酵素阻害剤「リバロ錠1mg・錠2mg・錠4mg」(製造販売元 興和株式会社、販売元 興和創薬株式会社)につきまして、用法の一部変更が承認されましたのでご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## 【用法・用量】

変更前(〰部削除)	変更後
通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回 <u>夕食後に経口投与</u> する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。	通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数がかかります。改訂添付文書は興和創薬株式会社ホームページ <http://www.kowa-souyaku.co.jp/> 及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載しておりますので、併せてご利用下さい。

以上