## 新発売および用法一部変更のご案内

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

# リバロOD<sub>錠</sub>4mg

(ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、HMG-CoA還元酵素阻害剤「リバロOD錠4mg」(一般名:ピタバスタチンカルシウム)を発売させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

現在発売中の「リバロ錠 1・2・4mg」「リバロ OD 錠 1・2mg」に本剤が加わることにより、薬剤の選択肢が拡がるとともに、アドヒアランス向上の一助としてお役立ていただければ幸いです。

また、用法の一部変更が承認され、「リバロ錠 1·2·4mg」「リバロOD錠 1·2mg」と同じ用法になりましたので併せてご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

#### **発売 日** 2013年12月13日(金)

#### **薬価基準収載日** 2013年12月13日(金)





#### 用法・用量

用法の一部変更が承認され、「リバロ錠 1·2·4mg」「リバロ OD 錠 1·2mg」と同じ用法になりました。

#### 変更前(\_\_\_\_部削除)

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして  $1 \sim 2 \text{mg} \, \epsilon \, 1 \, \Box \, 1 \, \Box \, 2 \, \underline{\delta} \,$ 

なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして 1~2mgを1日1回経口投与する。

変更後

なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数がかかります。

改訂添付文書は興和創薬株式会社ホームページhttp://www.kowa-souyaku.co.jp/及び医薬品医療機器情報提供ホームページhttp://www.info.pmda.go.jp/に掲載しておりますので、併せてご利用下さい。また、本改訂後より「リバロOD錠 1・2mg」と併せた添付文書になります。

裏面もご覧下さい



## ■ 薬価/規制区分等

販売名	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	レセプト電算処理 システムコード	規制区分	貯法	使用期限
リバロOD錠 4mg	4mg1錠 238.70円	2189016F6020	2189016F6020	622287601	処方せん医薬品	気密容器、遮光、 室温保存	3年

## ■ 包装単位薬価/JANコード等

	販売名	包装	包装単位 薬価	統一商品コード	1001 L*	GS1:	HOT番号
					JANコード	調剤包装単位	販売包装単位
	リバロ OD錠 4mg	PTP100錠 (10錠×10)	23,870.00円	770509901	4 987770 509901	(01)04987770509918	(01)14987770509908

## ■ 個装箱・梱包箱のサイズ

<b>服主</b> 々	包装	個装箱		梱包箱			
販売名	己衣	サイズ(長辺×短辺×高さ)	重量	梱包単位	サイズ(長辺×短辺×高さ)	重量	
リバロOD錠4mg	PTP100錠(10錠×10)	$134$ mm $\times 51$ mm $\times 48$ mm	72g	100	$546$ mm $\times$ $296$ mm $\times$ $265$ mm	7.7kg	